

À propos du cancer de l'ovaire


Le cancer de l'ovaire est une forme de cancer qui survient lorsque les cellules de l'ovaire, des trompes de Fallope ou du péritoine se développent anormalement et de façon anarchiqueⁱ.

Le cancer de l'ovaire peut prendre naissance dans trois types de cellules : les cellules épithéliales, les cellules germinales et les cellules stromales.

Le cancer de l'ovaire épithélial est le type de cancer de l'ovaire le plus courant, représentant 90 % de tous les casⁱ.

Cancer épithélial de l'ovaire

Le cancer se développe à partir des couches superficielles des ovaires, des trompes de Fallope ou du péritoine.



D'après Medline Plusⁱⁱⁱ

Cellule tumorale = 

Causes

On ne sait pas exactement ce qui cause le cancer de l'ovaire, mais les facteurs de risque comprennentⁱⁱⁱ :

- Antécédents familiaux de cancer de l'ovaire ou du sein
- Mutations génétiques délétères, notamment mutation du gène *BRCA*
- Diagnostic antérieur d'endométriose
- Vieillesse
- Infertilité
- Tabagisme
- Syndrome de Lynch (trouble génétique)



Signes et symptômes

Nombre de femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire précoce ne présentent aucun signe ni symptôme, et lorsque ceux-ci se manifestent, ils s'apparentent à ceux d'autres pathologies plus courantes et plus bénignes, ce qui peut compliquer et retarder le diagnostic. Voici certains symptômes précocesⁱⁱⁱ :

- Douleurs, gonflement ou ballonnements abdominaux
- Changement du transit intestinal
- Douleurs pelviennes et lombaires
- Fatigue
- Besoin fréquent ou urgent d'uriner



Patients et prévalence



Le cancer épithélial de l'ovaire est le type de cancer de l'ovaire **le plus courant**ⁱ

On estime que **3100** Canadiennes ont reçu un diagnostic de cancer de l'ovaire en 2020 et que **1950** ont succombé à la maladie^{iv}

Près de **75 %** des cas de cancer de l'ovaire sont diagnostiqués à un **stade avancé**^v

Au Canada, le cancer de l'ovaire se classe au 8^e rang des cancers les plus répandus chez les femmes, et est **le plus meurtrier des cancers gynécologiques**^{iv}.

75 % des femmes atteintes de la maladie subissent une **récidive**^v

Pour tous les types de cancers de l'ovaire, le **taux de survie à 5 ans** est de **45 %**^{iv}

Diagnostic

Des examens et des tests peuvent aider à diagnostiquer le cancer de l'ovaire, notammentⁱⁱ :

- Biopsie
- Examen physique et examen pelvien
- Échographie et autres examens d'imagerie
- Analyses sanguines



Traitement

Les plans de traitement du cancer de l'ovaire comprennent généralement une combinaison des traitements suivantsⁱⁱⁱ :

- Chirurgie
- Traitement ciblé
- Chimiothérapie



Références

ⁱ Drapkin, R.I. Ovarian Cancer. National Organization for Rare Disorders (NORD). <https://rarediseases.org/rare-diseases/ovarian-cancer/>. Consulté en avril 2020.

ⁱⁱ Ovarian Cancer. Genetic and Rare Disease Information Center (GARD). <https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/7295/ovarian-cancer>. Consulté en avril 2020.

ⁱⁱⁱ Ovarian Cancer. MedlinePlus. <https://medlineplus.gov/ovariancancer.html>. Publié le 20 août 2019. Consulté en avril 2020.

^{iv} Société canadienne du cancer. Statistiques sur le cancer de l'ovaire. 2020.

^v Lheureux, S., Braunstein, M., & Oza, A. M. (2019). Epithelial ovarian cancer: evolution of management in the era of precision medicine. CA: a cancer journal for clinicians, 69(4), 280-304.